



La sternbergie jaune (*Sternbergia lutea*) de la famille des amaryllidacées.

Noms vernaculaires : vendangeuse, crocus jaune, amaryllis jaune...

Malgré les apparences, la sternbergie jaune est plus proche d'un narcisse que d'un crocus. En effet, comme chez le narcisse, le bouton floral est enfermé dans une spathe blanchâtre translucide et l'ovaire de la fleur est infère. Le nombre des étamines permet de clairement différencier la vendangeuse d'un vrai crocus : la sternbergie en possède 6, le vrai crocus en possède 3.

L'originalité principale de la sternbergie jaune réside dans l'époque de sa floraison. Si la plupart des plantes bulbeuses fleurissent au cours du printemps, cette espèce exotique naturalisée dans certains vignobles s'épanouit au cours de l'automne au moment des vendanges. Certaines années, en fonction des conditions météorologiques de l'été, elle peut apparaître dès la fin du mois d'août.

Etymologie


Le genre *Sternbergia* est dédié à un botaniste d'origine autrichienne, Kaspar von Sternberg, fondateur du muséum d'histoires naturelles de Prague.

Le nom spécifique provient du latin *luteum* qui désigne la couleur jaune. C'est évidemment en référence aux fleurs d'un beau jaune éclatant.



Description

La sternbergie jaune est une plante herbacée bulbeuse à cycle inversé par rapport à la plupart des bulbeuses classiques. On pourrait la comparer au colchique d'automne mais à la différence de cette espèce, ses fleurs et ses feuilles arrivent simultanément en fin d'été et au début de l'automne. Les fleurs forment de belles coupes jaune d'or très lumineuses d'une quinzaine de centimètres. Les feuilles linéaires vert très foncé persistent tout l'hiver. Elles disparaissent progressivement en mai-juin de l'année suivante, après quoi, la plante entre en dormance durant tout l'été. C'est l'époque la plus favorable pour éventuellement diviser les touffes. Les bulbes, très comparables à ceux des narcisses, seront disposés dans un endroit chaud, de préférence en plein soleil et dans un sol bien drainé. Les conditions météorologiques de l'été ont une grande influence sur l'époque et l'intensité de la floraison. Un été chaud et sec, suivi de pluies abondantes début septembre, déclenche l'entrée en végétation et une floraison remarquable.



Comme la sternbergie jaune, les fleurs du colchique d'automne (*Colchicum autumnale*) s'épanouissent en septembre-octobre. La différence réside dans la couleur des fleurs et dans l'époque d'apparition du feuillage.

Les feuilles du colchique n'apparaissent qu'au cours du printemps qui suit la floraison. Ces feuilles très larges entourent des fruits volumineux qui contiennent de nombreuses graines.

Le saviez-vous ?

Il existe d'autres espèces de *Sternbergia*, certaines à floraison printanière comme *Sternbergia vernalis*.